

## ALLERJİ TESTLERİ ÖNCESİNDE KULLANILMAMASI GEREKEN İLAÇLAR

**ÖN BİLGİ:** Allerji ilaçları (antihistaminler), öksürük şurupları, grip-soğuk algınlığı ilaçları ve bazı taşıt tutmasına karşı ilaçlar allerji testlerinin sonuçlarının yanlış çıkmasına neden olmaktadır. Allerji testleri uygulanacak hastaların bu ilaçları belli süreler öncesinde kullanmıyor olmaları gereklidir.

Ticari adları farklı ama aynı kimyasal maddeyi içeren ilaçlara muadil (eşdeğer) adı verilir. Piyasada birçok muadil ilaç vardır. Bu nedenle aşağıdaki listelerde ilaçlar kimyasal madde adları ile sıralanmış, yanlarına da ticari adlarına örnekler verilmiştir. LİSTEDE BULUNMAYAN BİR İLAÇ KULLANIYORSANIZ, PLANLAMA AŞAMASINDA HEKİME BİLDİRİNİZ.

**ÖNEMLİ NOT:** Yüksek tansiyon, kalp hastalığı, şeker hastalığı gibi hastalıklar nedeniyle sürekli kullanılan ilaçlar test planlama aşamasında hekime bildirilmeli ve bu ilaçlar KESİLMEMELİDİR.

### ALLERJİ TESTİNDEN 5 GÜN ÖNCESİNDE KESİLMESİ GEREKEN İLAÇLAR

Kimyasal Madde Adı	Piyasa Adı
Loratadine	Alarin, Antor, Claritin, Clarinase, Hismen, Histadin, Loradif, Lorantis, Loraver, Loritin, Ritin
Fexofenadine	Fexadyne, Fexofen, Telfast
Desloratadine	Aerius
Cetirizine	Allerset, Cetryn, Cirrus, Hitrizin, Ressital, Rynset, Setiral, Virlix, Yenizin, Zyrtec
Levo-Cetirizine	Xyzal
Hydroxyzine	Atarax, Vistaril
Diphenhydramine	Allerjin, Benil, Benison, Defeks, Fenidin, Fenotral, Gayaben, Historan, Hydryllin, Koklin, Neo-jucodin, Pedilin, Tuseptil
Ketotifen	Astafen, Fumast, Zaditen
Chlorpheniramine	A-ferin, Apex, Babyrhinol, Benical, Broncar, Cetaflu, Coldex, Contex, Corsal, Deflu, Deksa, Dorfan, Dristan, Ekorinol, Forza, Gerakon, Gribex, Katarin, Kongest, Medicold, Oledro, Theraflu, Triatus, Tukodil, Tusifon, Tylol, Vermidon Cold, Vermidon Hot, Vicks vapodry, Wintus
Tripolidin	Actifed, Actidem, Tussifed
Clemastine	Tavegyl
Meclizine	Postadoxine
Pheniramin	Antibeksin, Avil
Cyproheptadine	Prakten, Sipraktin
Pyrilamine	Peditus
Dimenhydrinate	Anti-em, Dramamine, Xamamine
Promethazine	Artu, Sekodin
Doxylamine	Unisom

### ALLERJİ TESTİNDEN ÖNCEKİ GECE KESİLMESİ GEREKEN İLAÇLAR

Kimyasal Madde Adı	Piyasa Adı
Montelukast	Singulair, Onceair, Zespira, Notta
Zafirlukast	Accolate
Ranitidine	Ranitab, Ranitine, Ranobel, Rozon, Santanol, Ulcuran, Zantid, Zantac, Pylorid
Famotidine	Duovel, Fagastiril, Famec, Famo, Famodin, Famogast, Famoser, Famotep, Famotsan, Gasterol, Gastifam, Gastover, Gastrofam, Gastrosidin, Neotab, Nevofam, Notidin, Pepdif, Peptifarm, Ulcusar
Nizatidin	Axid

AYRICA;

Bazı depresyon ilaçları da (trisiklik yapıda olanlar) allerji test sonuçlarını etkileyebilir. Bu tür bir ilaç kullanıyorsanız lütfen test planlama aşamasında hekime bildiriniz.